

## ALCUNE CAUSE DI NON IDONEITÀ TEMPORANEA ALLA DONAZIONE

<b>FEBBRE superiore a 38°C</b>	Sospensione per 15 giorni
<b>ANTIBIOTICI</b>	Sospensione per 15 giorni
<b>Cure ODONTOIATRICHE</b>	Sospensione per massimo 7 giorni
<b>ESAMI STRUMENTALI</b> (gastroscopia, artroscopia, colonscopia, rettoscopia, endoscopia in genere) e/o USO DI CATETERI	Sospensione per quattro mesi
<b>CICLO MESTRUALE</b>	E' <u>consigliato</u> rinviare la donazione
<b>GRAVIDANZA</b> - durante la gestazione - dalla data del parto - dalla interruzione (aborto)	Sospensione Sospensione per un anno Sospensione per sei mesi
<b>VACCINAZIONI</b> - Allergie - Influenza, Pertosse, Tetano - Epatite A e B	<i>In assenza di sintomi:</i> Sospensione per 72 ore Sospensione per 48 ore Sospensione per 48 ore
<b>TRASFUSIONI</b> sangue, plasma, piastrine, fattori della coagulazione, albumina, immunoglobuline (sieroprofilassi ANTITETANICA)	Sospensione per quattro mesi
<b>AGOPUNTURA</b> - in ambiente medico (con aghi 'usa e getta') - in tutti gli altri casi	Nessuna sospensione Sospensione per quattro mesi
<b>FORATURA DELLE ORECCHIE, <i>PIERCING</i></b>	Sospensione per quattro mesi
<b>TATUAGGI</b>	Sospensione per quattro mesi